

## **ANÁLISIS DE LA RELACIÓN INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS- RESULTADOS NEGATIVOS DE LA FARMACOTERAPIA EN UNA FARMACIA COMUNITARIA.**

**Cremades J., Arrebola I., Domínguez L., Miragall J., Gonzalo M.**

**INTRODUCCIÓN:** La incidencia de interacciones farmacológicas clínicamente relevantes es baja, pero los posibles riesgos yatrogénicos aconsejan su control.

**OBJETIVO:** Analizar la incidencia de interacciones detectables en la dispensación y los resultados negativos de la farmacoterapia que pudieran ocasionar.

**MÉTODOS:** En una farmacia comunitaria de Aspe (Alicante), durante el segundo semestre de 2005, se registraron las interacciones detectadas en la dispensación con ayuda de un programa informático de gestión que integra la base de datos del CGCOF. También se registró la actuación del farmacéutico encaminada a detectar si éstas pudieran tener consecuencias sobre la salud de los pacientes y la intervención realizada.

**RESULTADOS:** Se detectaron 242 interacciones, que representan el 1.27% de las operaciones de dispensación. La edad media de los pacientes en que aparecieron interacciones fue de 60.2±13.4 años, siendo mujeres el 70.5% de los casos.

De los fármacos implicados destacan el acenocumarol (53 casos), seguido de calcio (29), ácido alendrónico, digoxina y omeprazol (19), y paracetamol (18). En cuanto a la actuación del farmacéutico, en el 14.5% de los casos aportó información al paciente y en el 1.6% al médico.

Los posibles resultados negativos de la farmacoterapia debidos a las interacciones corresponderían un 61.5% a inseguridades y un 38.5% a inefectividades. Sin embargo, tras la derivación a seguimiento farmacoterapéutico, en los casos que se estimó conveniente, se detectó que las interacciones tan sólo tenían repercusión clínica en el 5.4% de los casos, correspondiendo el 30.8% a inseguridades y el 69.2% a inefectividades.

**CONCLUSION:** La mayoría de interacciones detectadas no parecen tener importancia clínica, pero hay una pequeña proporción que originan resultados negativos de la medicación. Por ello, el establecimiento de una pauta de actuación durante la dispensación podría suponer una buena herramienta para evitar éstos eventos y así mejorar el proceso de uso de los medicamentos.